

【大腸癌】

レジメン名	薬剤名	用量	用法	1サイクル
Capecitabine	カペシタビン	2500mg/m ² /day	経口投与Day1-14	21日
S-1	エスワンタイホウ	80-120mg/day	経口投与Day1-14	21日
UFT/LV	UFT	300mg/m ² /day	経口投与Day1-28	35日
	ユーゼル	75mg/day	経口投与Day1-28	
BV+mFOLFOXIRI	アバスチン	5mg/kg	点滴静注Day1	14日
	カンプト	150mg/m ²	点滴静注Day1	
	エルプラット	85mg/m ²	点滴静注Day1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注Day1	
	5FU	2400mg/m ²	持続静注Day1 46時間	
BV+mFOLFOX6	アバスチン	5mg/kg	点滴静注Day1	14日
	エルプラット	85mg/m ²	点滴静注Day1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注Day1	
	5FU	400mg/m ²	急速静注Day1	
	5FU	2400mg/m ²	持続静注Day1 46時間	
Pmab+mFOLFOX6	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注Day1	14日
	エルプラット	85mg/m ²	点滴静注Day1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注Day1	
	5FU	400mg/m ²	急速静注Day1	
	5FU	2400mg/m ²	持続静注Day1 46時間	
Cmab+mFOLFOX6	アービタックス	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注Day1,8	14日
	エルプラット	85mg/m ²	点滴静注Day1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注Day1	
	5FU	400mg/m ²	急速静注Day1	
	5FU	2400mg/m ²	持続静注Day1 46時間	
mFOLFOX6	エルプラット	85mg/m ²	点滴静注Day1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注Day1	
	5FU	400mg/m ²	急速静注Day1	
	5FU	2400mg/m ²	持続静注Day1 46時間	
BV+mFOLFIRI	アバスチン	5mg/kg	点滴静注Day1	14日
	カンプト	150mg/m ²	点滴静注Day1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注Day1	
	5FU	400mg/m ²	急速静注Day1	
	5FU	2400mg/m ²	持続静注Day1 46時間	
Pmab+mFOLFIRI	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注Day1	14日
	カンプト	150mg/m ²	点滴静注Day1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注Day1	
	5FU	400mg/m ²	急速静注Day1	
	5FU	2400mg/m ²	持続静注Day1 46時間	
Cmab+mFOLFIRI	アービタックス	初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	点滴静注Day1,8	14日
	カンプト	150mg/m ²	点滴静注Day1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注Day1	
	5FU	400mg/m ²	急速静注Day1	
	5FU	2400mg/m ²	持続静注Day1 46時間	

【大腸癌】

レジメン名	薬剤名	用量	用法	1サイクル
Rmab+mFOLFIRI	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注Day1	14日
	カンプト	150mg/m ²	点滴静注Day1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注Day1	
	5FU	400mg/m ²	急速静注Day1	
	5FU	2400mg/m ²	持続静注Day1 46時間	
mFOLFIRI	カンプト	150mg/m ²	点滴静注Day1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注Day1	
	5FU	400mg/m ²	急速静注Day1	
	5FU	2400mg/m ²	持続静注Day1 46時間	
BV+XELOX	アバスチン	7.5mg/kg	点滴静注Day1	21日
	エルプラット	130mg/m ²	点滴静注Day1	
	カペシタビン	2000mg/m ² /day	経口投与Day1-14	
XELOX	エルプラット	130mg/m ²	点滴静注Day1	21日
	カペシタビン	2000mg/m ² /day	経口投与Day1-14	
BV+Cape	アバスチン	7.5mg/kg	点滴静注Day1	21日
	カペシタビン	2000mg/m ² /day	経口投与Day1-14	
BV+SOX	アバスチン	7.5mg/kg	点滴静注Day1	21日
	エルプラット	130mg/m ²	点滴静注Day1	
	エスワнтаイホウ	80-120mg/day	経口投与Day1-14	
SOX	エルプラット	130mg/m ²	点滴静注Day1	21日
	エスワнтаイホウ	80-120mg/day	経口投与Day1-14	
SIRB	アバスチン	7.5mg/kg	点滴静注Day1	21日
	カンプト	150mg/m ²	点滴静注Day1	
	エスワнтаイホウ	80-120mg/day	経口投与Day1-14	
IRIS	カンプト	125mg/m ²	点滴静注Day1,15	28日
	エスワнтаイホウ	80-120mg/day	経口投与Day1-14	
SIR	カンプト	150mg/m ²	点滴静注Day1	21日
	エスワнтаイホウ	80-120mg/day	経口投与Day1-14	
2w-CPT-11	カンプト	150mg/m ²	点滴静注Day1	14日
Pmab	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注Day1,15	28日
Cmab	アービタックス	初回400mg/m ²	点滴静注Day1,8,15, 22	28日
		2回目以降250mg/m ²		
Pmab+CPT-11	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注Day1,15	28日
	カンプト	150mg/m ²	点滴静注Day1, 15	
Cmab+CPT-11	アービタックス	初回400mg/m ²	点滴静注Day1,8,15, 22	28日
		2回目以降250mg/m ²		
Regorafenib	スチバーガ	160mg/day	経口投与Day1-21	28日
		70-150mg/day	経口投与Day1-5,8-12	
FTD/TPI	ロンサーフ	70-150mg/day	経口投与Day1-5,8-12	28日
		5mg/kg	点滴静注Day1,15	
BV+FTD/TPI	アバスチン	5mg/kg	点滴静注Day1,15	28日
		ロンサーフ	70-150mg/day	
PER+HER	パージェタ	初回840mg	点滴静注Day1	21日
		2回目以降420mg		
	ハーセプチン	初回8mg/kg	点滴静注Day1	
		2回目以降6mg/kg		