

## 【胃癌】

レジメン名	薬剤名	用量	用法	1サイクル
Nivolumab +CAPOX	オブジーボ	360mg/回	点滴静注Day1	21日
	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	経口投与Day1-14	21日
	エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	
Nivolumab+SOX	オブジーボ	360mg/回	点滴静注Day1	21日
	エスワンタイホウ	80-120mg/day	経口投与Day1-14	21日
	エルプラット	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	
Nivolumab +mFOLFOX6	オブジーボ	240mg/回	点滴静注Day1	14日
	エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	
	5FU	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注Day1	
	5FU	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注Day1 46時間	
DS(術後補助)	エスワンタイホウ	80-120mg/day	経口投与Day1-14[16サイクル]	21日
	ドセタキセル	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1[2-7サイクル]	
XELOX(胃)術後補助	エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	21日
	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	経口投与Day1-14	
S-1	エスワンタイホウ	80-120mg/day	経口投与Day1-28	42日
S-1+CDDP	エスワンタイホウ	80-120mg/day	経口投与Day1-21	35日
	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day8	
Cape+CDDP	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	経口投与Day1-14	21日
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	
SOX	エスワンタイホウ	80-120mg/day	経口投与Day1-14	21日
	エルプラット	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	
mFOLFOX6	エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	
	5FU	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注Day1	
	5FU	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注Day1 46時間	
3w-HER	トラスツズマブ	初回8mg/kg	点滴静注Day1	21日
		2回目以降6mg/kg		
RAM+PTX	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注Day1,15	28日
	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1,8,15	
RAM+nabPTX	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注Day1,15	28日
	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1,8,15	
RAM単独	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注Day1	14日
triweeklynabPTX	アブラキサン	260mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	21日
weeklynabPTX	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1,8,15	28日
DTX	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	21日
weeklyPTX	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1,8,15	28日
Nivolumab	オブジーボ	240mg/回	点滴静注Day1	14日
FTD/TPI	ロンサーフ	70-150mg/day	経口投与Day1-5,8-12	28日
2w-CPT-11	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	14日
XELOX(胃)進行再発	カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup> /day	経口投与Day1-14	21日
	エルプラット	130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注Day1	