


外来手術を受けた患者様へ

次の注意事項をよく読んで、施術後の療養に努めてください。



- ◇ 手術は局所麻酔にて処置をしました。

手術後 1～2 時間で麻酔が切れ、痛みが増す事があります。

お薬が処方された場合は、医師の指示通りに服用してください。



- ◇ 痛みが増してきたら、我慢せず痛み止めの薬を飲んで下さい。

- ◇ 化膿止めの薬は毎食後、無くなるまで飲み続けて下さい。

- ◇ 手術を受けた日はお風呂、お酒、運動、重労働などは控えて下さい。

- ◇ 指定された次回受診日に外来を受診して下さい。



- ◇ 約7日後に外来で糸を抜きます(抜糸)。

糸を抜くまでは重労働やスポーツ等は避け、患部はできるだけ安静を保って下さい。

(手足の傷は挙上した方が痛みも少なく、早く治ります。)

- ◇ 傷は糸を抜くまで毎日の消毒は不要ですが、なるべく触ったり、こすったり、水に濡らさないように注意して下さい。

- ◇ 出血や痛みがひどくなってきた場合やその他ご心配なことがあった場合は、当院またはお近くの病院を受診してください。

その他不明な点がありましたら、医師又は看護師にお尋ね下さい。

名古屋共立病院 形成外科

TEL : 052-362-5151